

その他

リウマチ（整形外科）

レジメン名

インフリキシマブ	点滴時間	Day1	Day15	Day43	Day99
(1)生理食塩液 500ml	ルート確保	●	●	●	●
(2)インフリキシマブ点滴静注 3~10mg/kg 生理食塩液 250ml	120分	●	●	●	●

☆通常は3mg/kgで投与する。

初回、2週間後、6週間後に投与し、以降8週間毎に投与となる。

8週間の間隔で10mg/kgまで増量できる。投与間隔を短縮した場合、6mg/kgとする。

最短の投与間隔は4週間とする。

●アセトアミノフェン200mg 1回2錠をインフリキシマブ投与前に内服する。

クローン（内科）

レジメン名

レミケード(インフリキシマブ)	点滴時間	Day1
(1)大塚生食注 100ml ポララミン注5mg 2A	30分	●
(2)大塚生食注 100ml ハイドロコートン注射液100mg 1V	30分	●
(3)レミケード点滴静注(インフリキシマブ) 5 ~10mg/kg 生理食塩液 250ml	3時間	●

☆通常は5mg/kgで投与する。

初回、2週間後、6週間後に投与し、以降8週間毎に投与となる。

6週以降、最大10mg/kgまで増量できる。

●アセトアミノフェン200mg 1回2錠をレミケード(インフリキシマブ)投与前に内服する。

<最終更新：2021年7月>