

胃癌
レジメン名

SOX(S-1+1-OHP)	点滴時間	Day1
(1)アロキシ点滴静注0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●
(2)ブドウ糖注射液 5% 500ml オキサリプラチン点滴静注 100mg/m ²	120分	●
(3)大塚生食注 50ml	30分	●
(4) S-1 Day1～Day14 内服		

★21日/クール

胃癌
レジメン名

Weekly PTX	点滴時間	Day1	Day8	Day15
(1)大塚生食注 100ml デキサート注射液3.3mg 2A ファモチジン注20mg 1A ポララミン注5mg 1A	30分	●	●	●
(2)大塚生食注 100ml パクリタキセル点滴静注 70mg/m ²	60分	●	●	●
(3)大塚生食注 100ml	30分	●	●	●

★28日/クール

●デキサート注 初回5A 2回目以降2A

胃癌
レジメン名

サイラムザ単独療法	点滴時間	Day1
(1)大塚生食注 50ml ポララミン注5mg 1A	30分	●
(2)生理食塩液 250ml サイラムザ点滴静注 8mg/kg	60分	●
(3)大塚生食注 50ml	30分	●

★14日/クール

●デキサート注 初回5A 2回目以降2A

胃癌・食道がん

胃癌

レジメン名

サイラムザ+PTX	点滴時間	Day1	Day8	Day15
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 ポララミン注5mg 1A デキサート注3.3mg 2A ファモチジン注20mg 1A	30分	●	●	●
(2) 生理食塩液 250ml サイラムザ点滴静注 8mg/kg	60分	●		●
(3) 大塚生食注 100ml	60分	●		●
(4) 生理食塩液 250ml パクリタキセル注 80mg/m ²	60分	●	●	●
(5) 大塚生食注 50ml	15分	●	●	●

★28日/クール

胃癌

レジメン名

Tmab+SOX	点滴時間	Day1
(1) 大塚生食注 50ml	30分	●
(2) 生理食塩液 250ml ハーセプチン注射用 8mg/kg	90分	●
(3) アロキシ点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 2A	30分	●
(4) ブドウ糖注射液 5% 500ml オキサリプラチン点滴静注 100mg/m ²	120分	●
(5) 大塚生食注 50ml	30分	●
(6) S-1 Day1～Day14 内服		

★21日/クール

●ハーセプチン初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg

食道がん

レジメン名

FP療法(5-FU+シスプラチン) 放射線療法後	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
(1) KN1号輸液 500ml	120分	●				
(2) 生理食塩液 500ml	120分	●				
(3) アロキシ点滴静注0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分	●				

胃癌・食道がん

(4)生理食塩液 500ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分		●	●	●	●
(5)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 40mg/m ²	4時間	●				
(6)生理食塩液 500ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	24時間	●	●	●	●	●
(7)KN3号輸液 500ml ラシックス注20mg 1A	120分	●				
(8)KN1号輸液 500ml	120分	●				

★14日/クール

●アプレピタントセット Day1 125mg、Day2、3 80mg服用

●シスプラチンとフルオロウラシル同時投与。フルオロウラシルは5日間持続投与。

食道がん
レジメン名

5FU+CDGP	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
(1)KN1号輸液 500ml	120分	●				
(2)生理食塩液 500ml	120分	●				
(3)アロキシ点滴静注0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分	●				
(4)生理食塩液 500ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分		●	●	●	●
(5)生理食塩液 50ml	プライミング	●				
(6)生理食塩液 500ml アクブラ静注用 90mg/m ²	4時間	●				
(7)ブドウ糖注射液 5% 500ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	24時間	●	●	●	●	●
(8)KN3号輸液 500ml ラシックス注20mg 1A	120分	●				
(9)KN1号輸液 500ml	120分	●				

★28日/クール

●アクブラとフルオロウラシル同時投与。フルオロウラシルは5日間持続投与。

食道がん
レジメン名

ドセタキセル 3Wごと	点滴時間	Day1
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注射液3.3mg 1A	30分	●
(2) ブドウ糖注射液 5% 250ml ドセタキセル点滴静注 70mg/m ²	60分	●
(3) 大塚生食注 100ml	30分	●

★21日/クール

食道がん
レジメン名

Weekly PTX	点滴時間	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36
(1) 大塚生食注 50ml デキサート注射液3.3mg 2A ファモチジン注20mg 1A ポララミン注5mg 1A	30分	●	●	●	●	●	●
(2) 生理食塩液 250ml パクリタキセル注 100mg/m ²	60分	●	●	●	●	●	●
(3) 大塚生食注 50ml	15分	●	●	●	●	●	●

★49日/クール

<最終更新：2021年7月>