

尿路上皮癌

レジメン名

キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	点滴時間	Day1
(1)大塚生食注 50ml	30分	●
(2)キイトルーダ点滴静注 200mg/body 大塚生食注 50ml	30分	●

★21日/クール

- 解熱剤、抗アレルギー薬は2回目以降から患者様の容態をみて処方考慮
- 制吐薬は不要

尿路上皮癌

レジメン名

TC療法(CBDCA+PTX)	点滴時間	Day1
(1)グラニセロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 3A ファモチジン注20mg 1A	30分	●
(2)パクリタキセル注 200mg/m ² ブドウ糖注射液 5% 500ml	3時間	●
(3)カルボプラチン点滴静注 AUC=6 生理食塩液バッグ 250ml	60分	●
(4)大塚生食注 50ml	30分	●

★21日/クール

- アブレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用
- 過敏症予防に抗ヒスタミン薬(オロパタジン)内服→パクリタキセル投与60分前までに内服
- Day2～4 デカドロン錠0.5mg 8錠 分2朝昼服用
- カルボプラチンはAUC:6(カルバート式)

尿路上皮癌

レジメン名

GC療法(GEM+CDDP)	点滴時間	Day1	Day2	Day3・4	Day8	Day15
(1)ウィーンD輸液 500ml	6時間	●	●×2	●×2		
(2)アクチット輸液 500ml	6時間	●	●×2	●×2		
(3)大塚生食注 100ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●			●	●
(4)大塚生食注 100ml ゲムシタビン点滴静注 1000mg/m ²	30分	●			●	●
(5)アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分		●			
(6)大塚生食注 100ml デキサート注3.3mg 2A ザンタック注50mg 1A	30分			●		
(7)マンニットT15% 250ml	30分		●×2			

尿路上皮癌

(8)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 70mg/m ²	4時間		●			
(9)大塚生食注 100ml ザンタック注50mg 1A	30分		●	●		

★28日/クール

●アプレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用

尿路上皮癌

レジメン名

GCb療法 (GEM+CBDCA)	点滴時間	Day1	Day8
(1)アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分	●	
(2)大塚生食注 100ml デキサート注射液3.3mg 3A	30分		●
(3)ブドウ糖注射液 5% 100ml ゲムシタビン点滴静注 1000mg/m ²	30分	●	●
(4)ブドウ糖注射液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注 AUC=4	60分	●	
(5)大塚生食注 50ml	30分	●	●

★21日/クール

●アプレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用

●カルボプラチンはAUC:3~5(カルバート式)

尿路上皮癌

レジメン名

M-VAC療法	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day15	Day22
(1)ヴィーンD輸液 500ml	6時間	●	●×2	●×2	●	●	●
(2)アクチット輸液 500ml	6時間	●	●×2	●×2	●		
(3)大塚生食注 100ml ザンタック注50mg 1A	30分	●×2	●×2	●×2	●×2	●	●
(4)5%ブドウ糖注射液 500ml メイロン静注7% 20ml 注射用メソトレキセート 30mg/m ²	4時間	●				●	●
(5)アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分		●				
(6)マンニットT15% 300ml	30分		●×2				
(7)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 70mg/m ²	4時間		●				

尿路上皮癌

(8)大塚生食注 100ml エクザール注射用 3mg	30分		●			●	●
(9)大塚生食注 100ml ドキソルビシン注 30mg/m ²	30分		●				
(10)大塚生食注 100ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分			●	●		

★28日/クール

●アブレピタント Day② 125mg、Day③、④ 80mg服用

尿路上皮癌

レジメン名

DDMVACBDCA療法	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1)ヴィーンD輸液 500ml メイロン静注7% 20ml	2時間	●×3		
(2)大塚生食注 100ml ダイアモックス注射用 250mg	30分	●		
(3)大塚生食注 100ml 注射用メソトレキセート 30mg/m ²	30分	●		
(4)ヴィーンD輸液 500ml	2時間		●	
(5)アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分		●	
(6)大塚生食注 100ml エクザール注射用 3mg/m ²	30分		●	
(7)大塚生食注 100ml ドキソルビシン注 30mg/m ²	30分		●	
(8)5%ブドウ糖注射液 250ml カルボプラチン点滴静注 AUC3～5	1時間		●	
(9)生食注 50ml	30分		●	
(10)ジーラスタ皮下注 3.6mg				●

★14日/クール

●アブレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用

●カルボプラチン AUC=3～5

尿路上皮癌

レジメン名

バベンチオ(アベルマブ)	点滴時間	Day1
(1)大塚生食注 50ml	30分	●
(2)バベンチオ点滴静注 10mg/kg 生理食塩液 250ml	60分	●
(3)大塚生食注 50ml	15分	●

★14日/クール

- バベンチオによる過敏症予防に対して、投与約30～60分前に
抗ヒスタミン薬(オロパタジン)および解熱鎮痛薬(カロナール錠500mg)を内服。
→5クール目以降は、過敏症がなければオロパタジンとカロナールの内服処方 省略可能

<最終更新：2022年2月>