

前立腺癌

前立腺がん

レジメン名

カバジタキセル療法	点滴時間	Day1	Day2
(1)大塚生食注 50ml	ルート確保	●	
(2)グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注射液3.3mg 2A ファモチジン注20mg 1A	30分	●	
(3)5%ブドウ糖液 250ml ジェブタナ点滴静注 25mg/m <sup>2</sup>	60分	●	
(4)生理食塩液 50ml	フラッシュ	●	
(5)ジーラスタ皮下注	皮下注		●
(6)プレドニン10mg内服	内服	Day1～Day21	

★21日/クール (28日/クールの場合もあるので注意)

●ジェブタナ導入時は20mg/m<sup>2</sup>開始 プレドニン10mgと併用する(Day1～Day21)

●好中球減少予防にDay2 ジーラスタ投与する。過敏症予防に抗ヒスタミン薬(オロパタジン)内服

前立腺癌

レジメン名

PE療法(シスプラチン+エトポシド)	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4
(1)KN3号輸液 500ml	120分	●			
(2)生理食塩液 500ml 硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	120分	●			
(3)アロキシ点滴静注0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 3A	30分	●			
(4)大塚生食注 50ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分		●	●	●
(5)ブドウ糖注射液 5% 500ml エトポシド点滴静注 100mg/m <sup>2</sup>	3時間	●	●	●	
(6)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 80mg/m <sup>2</sup>	3時間	●			
(7)KN3号輸液 500ml ラシックス注20mg 2A	120分	●			
(8)KN1号輸液 500ml	翌日まで	●	●	●	
(9)生理食塩液 500ml	6時間		●	●	

★21日/クール

●アプレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用

前立腺癌

前立腺癌  
レジメン名

sPE療法(シスプラチン+イトボシド)	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
(1)KN1号輸液 500ml 硫酸Mg補正液 1mEq/ml 10ml	120分	●				
(2)アロキシ点滴静注0.75mg 50ml デキサート注射液3.3mg 2A 生理食塩液 500ml	120分	●				
(3)生理食塩液 500ml デキサート注射液3.3mg 2A	120分		●	●		
(4)ブドウ糖注射液 5% 500ml イトボシド点滴静注 80mg/m <sup>2</sup>	120分	●	●	●		
(5)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 25mg/m <sup>2</sup>	120分	●	●	●		
(6)KN3号輸液 500ml ラシックス注20mg 2A	120分	●	●	●		
(7)KN1号輸液 500ml	翌日まで		●	●		
(8)生理食塩液 500ml	120分				●	●
(9)KN1号輸液 500ml	3時間				●	●

★21日/クール

●アプレピタント Day① 125mg、Day②、③ 80mg服用  
シスプラチン分割投与

<最終更新：2021年7月>