

膵癌

レジメン名

GEM単独	点滴時間	Day1	Day8	Day15
(1)大塚生食注 50ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●	●	●
(2)大塚生食注 100ml ゲムシタピン点滴静注 1000mg/m ²	30分	●	●	●
(3)大塚生食注 50ml	15分	●	●	●

★28日/クール 週1回の上記投与を3回繰り返し、1週休薬。

●吐き気止めとしてデキサート6.6mgを入れる。

膵癌

レジメン名

GEM単独+エルロチニブ	点滴時間	Day1	Day8	Day15
(1)大塚生食注 50ml デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●	●	●
(2)大塚生食注 100ml ゲムシタピン点滴静注 1000mg/m ²	30分	●	●	●
(3)大塚生食注 50ml	15分	●	●	●

タルセバ 100mg/日 Day1～Day28内服（食事1時間以上前または食後2時間以降）

★28日/クール 週1回の上記投与を3回繰り返し、1週休薬。

●吐き気止めとしてデキサート6.6mgを入れる。

膵癌

レジメン名

GEM単独+nab-PTX	点滴時間	Day1	Day8	Day15
(1)アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●	●	●
(2)大塚生食注 50ml アブラキサン点滴静注 125mg/m ²	30分	●	●	●
(3)大塚生食注 50ml	30分	●	●	●
(4)大塚生食注 100ml ゲムシタピン点滴静注 1000mg/m ²	30分	●	●	●
(5)大塚生食注 50ml	30分	●	●	●

★28日/クール 週1回の上記投与を3回繰り返し、1週休薬。

●吐き気止めとしてデキサート6.6mg アロキシ点滴。デカドロン8mg/日 Day2、3、9、10、16、17服用。

膵癌

レジメン名

オニバイド+5-FU/LV	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1)アロキシ点滴静注 0.75mg 1袋 デキサート注射液3.3mg 2A	30分	●		
(2)ブドウ糖注射液 5% 500ml オニバイド点滴静注 70mg/m ²	90分	●		
(3)大塚生食注 50ml	15分	●		
(4)ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●		
(5)大塚生食注 50ml	15分	●		
(6)大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●

★14日/クール

- フルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。インフューザーポンプ使用し46時間後に抜去する。
- Day2、3 デキサメタゾン8mg/日 分2 朝昼 服用。
- 遅発型下痢予防 酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、ウルソを、Day1～4に内服。

<最終更新：2021年7月>