

大腸がん

大腸がん
レジメン名

FOLFOX6+Bv	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 2A	30分	●		
(2) 大塚生食注 100ml アバステチン点滴静注 5mg/kg	90分	●		
(3) ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●		
(4) ブドウ糖注射液 5% 250ml オキサリプラチン注 85mg/m ²	120分	●		
(5) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	5分	●		
(6) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●

★14日/クール

- アバステチン投与時間 初回 90分 2回目以降 60分投与
- レボホリナートとオキサリプラチン同時投与。
- 持続点滴のフルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。インフューザーポンプ使用し46時間後に抜去する。

大腸がん
レジメン名

FOLFOX6	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 2A	30分	●		
(2) ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●		
(3) ブドウ糖注射液 5% 250ml オキサリプラチン注 85mg/m ²	120分	●		
(4) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	5分	●		
(5) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●

★14日/クール

- レボホリナートとオキサリプラチン同時投与。
- 持続点滴のフルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。

大腸がん
レジメン名

FOLFIRI	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 2A	30分	●		
(2) ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●		
(3) ブドウ糖注射液 5% 250ml イリノテカン点滴静注 150mg/m ²	90分	●		
(4) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	5分	●		
(5) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●

★14日/クール

- レボホリナートとイリノテカン同時投与。
- 持続点滴のフルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。
- Day2、3 デキサメタゾン8mg/日 分2 朝、昼 服用
- 遅発型下痢予防 酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、ウルソを、Day1～4に内

大腸がん

大腸がん レジメン名

FOLFIRI+Bv	点滴時間	Day1	Day2	Day3
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 2A	30分	●		
(2) 大塚生食注 100ml アバステチン点滴静注 5mg/kg	90分	●		
(3) ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●		
(4) ブドウ糖注射液 5% 250ml イリノテカン点滴静注 150mg/m ²	90分	●		
(5) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	5分	●		
(6) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●

★14日/クール

- アバステチン投与時間 初回 90分 2回目以降 60分投与
- レボホリナートとイリノテカン同時投与。
- 持続点滴のフルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。インフューザーポンプ使用し46時間後に抜去する
- Day2、3 デキサメタゾン8mg/日 分2 朝、昼 服用
- 遅発型下痢予防 酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、ウルソを、Day1～4に内

大腸がん レジメン名

XELOX	点滴時間	Day1
(1) グラニセトロン点滴静注 1袋 デキサート注3.3mg 3A	30分	●
(2) ブドウ糖注射液 5% 500ml オキサリプラチン点滴静注 130mg/m ²	120分	●
(3) 大塚生食注 50mL	30分	●

★21日/クール

- カペシタビン 体表面積に合わせて、投与量を調整→朝夕食後 1日2回内服
(体表面積 1.36m²未満の場合:1,200mg/回、1.36m²以上1.66m²未満:1,500mg/回、1.66m²以上1.96m²未満:1,800mg/回)

大腸がん レジメン名

Cmab単独(2回目以降)	点滴時間	Day1	Day8
(1) 大塚生食注 50ml ポララミン注 1A	30分	●	●
(2) 生理食塩液 250ml アービタックス注 250mg/m ²	60分	●	●
(3) 大塚生食注 100ml	30分	●	●

★14日/クール

- アービタックス RAS遺伝子野生型に有効

大腸がん

大腸がん レジメン名

Cmab+FOLFIRI (初回)	点滴時間	Day1	Day2	Day3	Day8
(1) カイトリル点滴静注(グラニセトロン) 1袋 デキサート注3.3mg 2A ポラミン注5mg 1A	30分	●			
(2) 生理食塩液 500ml アービタックス注 400mg/m ²	120分	●			
(3) ブドウ糖注射液 5% 250ml レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	120分	●			
(4) ブドウ糖注射液 5% 250ml イリノテカン点滴静注 150mg/m ²	90分	●			
(5) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 400mg/m ²	5分	●			
(6) 大塚生食注 50ml フルオロウラシル注 2400mg/m ²	46時間	●	●	●	
(7) 大塚生食注 50ml ポラミン注 1A	30分				●
(8) 生理食塩液 250ml アービタックス注 250mg/m ²	60分				●
(9) 大塚生食注 100ml	30分				●

★14日/クール

- アービタックス RAS遺伝子野生型に有効
- レボホリナートとイリノテカン同時投与。
- 持続点滴のフルオロウラシルは全量100mlとなるよう調整する。インフューザーポンプ使用し46時間後に抜去する
- Day2、3 デキサメタゾン8mg/日 分2 朝、昼 服用
- 遅発型下痢予防 酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、ウルソを、Day1～4に内

大腸がん レジメン名

カペシタビン+Bv	点滴時間	Day1
(1) 大塚生食注 50ml デキサート注3.3mg 1A	30分	●
(2) 大塚生食注 100ml アバステン点滴静注 7.5mg/kg	90分	●
(3) 大塚生食注 50mL	15分	●

★21日/クール

- アバステン投与時間 初回 90分 2回目以降 60分投与
- カペシタビン 2,000mg/m²/日 Day1夕よりDay15朝まで内服

＜最終更新：2021年7月＞